

Psihijatrijska nasljednost i post-traumatski stresni poremećaj: istraživanje među ratnim veteranim

Ivana Dijanić Plašć, Tina Peraica, Mirjana Grubišić-Ilić, Davor Rak, Andrea Jambrošić Sakoman, Dragica Kozarić-Kovačić

CMJ 2007; 48: 146-56

Cilj Utvrditi prevalenciju psihijatrijske nasljednosti (obiteljska povijest psihijatrijskih bolesti, ovisnosti o alkoholu i suicidalnosti) i povezanost psihijatrijske nasljednosti s dijagnozom poremećaja povezanih sa stresom u veterana hrvatskog Domovinskog rata koja je ustanovljena prilikom psihijatrijskog pregleda.

Metode U istraživanju je sudjelovalo 415 ratnih veterana. Svim ispitanicima je postavljena dijagnoza od strane istog psihijatra za vrijeme pregleda koji je napravljen u svrhu traženja naknade. Podaci su prikupljeni strukturiranim dijagnostičkim postupkom.

Rezultati Nije pokazana značajnija korelacija između nasljednosti psihijatrijske bolesti, ovisnosti o alkoholu, i suicidalnosti i dijagnoze post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP) ili PTSP-a s komorbiditetom. Dijagnoza psihoze ili psihoze s komorbiditetom bila je značajno povezana s psihijatrijskom nasljednošću ($\phi=0,111$; $P=0,023$). Pokazali smo statistički značajnu povezanost između psihijatrijske bolesti majke i bolesnikove dijagnoze djelomičnog PTSP-a ili djelomičnog PTSP-a s komorbiditetom ($\phi=0,104$; $P=0,035$) i psihoze ili psihoze s komorbiditetom ($\phi =0,113$; $P=0,022$); psihijatrijske bolesti oca i bolesnikove dijagnoze psihoze i psihoze s komorbiditetom ($\phi=0,130$; $P=0,008$), ovisnosti o alkoholu ili ovisnosti o alkoholu s komorbiditetom ($\phi =0,166$; $P=0,001$); psihijatrijske bolesti u primarnoj obitelji s bolesnikovom psihozom ili psihozom s komorbiditetom ($\phi=0,115$; $P=0,019$); ovisnost o alkoholu u primarnoj obitelji s bolesnikovim poremećajem ličnosti ili poremećajem ličnosti s komorbiditetom ($\phi=0,099$; $P=0,044$); i suicidalnosti u primarnoj obitelji s dijagnozom poremećaja ličnosti ili poremećaja ličnosti s komorbiditetom ($\phi =0,128$; $P=0,009$).

Zaključak Istraživanje je potvrđilo da pojedinac s pozitivnom roditeljskom ili obiteljskom povješću psihijatrijskih poremećaja ima viši rizik od razvijanja psihijatrijskih bolesti ili ovisnosti o alkoholu i drogi. Psihijatrijska nasljednost nije nužna da pojedinac koji je bio izložen teškim ratnim zbivanjima razvije simptome PTSP-a.