

Posljedice neliječenog posttraumatskog stresnog poremećaja nakon rata u bivšoj Jugoslaviji: morbiditet, subjektivna kvaliteta života, i troškovi skrbi

*Stefan Priebe, Aleksandra Matanov, Jelena Janković Gavrilović, Paul McCrone, Damir Ljubotina,
Goran Knežević, Abdulah Kučukalić, Tanja Francisković, Matthias Schützwohl*

Cilj Odrediti dugoročne ishode mentalnog zdravlja ljudi koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) povezanog s ratom, a ne dobivaju prikladno liječenje.

Postupci Proveli smo razgovor s 264 ispitanika iz bivše Jugoslavije, koji su živjeli u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Svi su patili od PTSP-a u nekom trenutku nakon rata, ali nikad nisu dobivali psihološku ili psihijatrijsku pomoć. Razgovori su se odvijali u prosjeku $10,7 \pm 3,0$ godina nakon traume izazvane ratom. Ishodi su bili PTSP na Kliničkom intervjuu za dijagnozu PTSP-a (engl., *Clinician Administered PTSD Scale*) za Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje -IV, subjektivna kvaliteta života (SQOL) na Manchesterskom upitniku za kratku procjenu kvalitete života (engl., *Manchester Short Assessment of Quality of Life*), tei troškovi skrbi. Ispitana je povezanost između socio-demografskih obilježja, razine traumatskih ratnih doživljaja, i aspekata poslijeratne situacije i ishoda.

Rezultati Trenutni PTSP dijagnosticiran je u 83,7% ispitanika, aritmetička sredina SQOL bodova bila je $4,0 \pm 0,9$, a aritmetička sredina troškova skrbi u posljednja 3 mjeseca premašila je €1100 u svakom centru. Starija dob, traumatičniji ratni doživljaji, lošije obrazovanje i život u post-konfliktnim zemljama bili su povezani s višim stopama trenutnog PTSP-a. Starija dob, ratno iskustvo, traumatičniji ratni događaji, nezaposlenost, život u samoći, život u kolektivnom smještaju i trenutni PTSP bili su neovisno povezani s nepovoljnijom subjektivnom kvalitetom života. Starija dob i život u Njemačkoj bili su povezani višim troškovima formalne skrbi.

Zaključak Ljudi s neliječenim PTSP-om izloženi su većem riziku od PTSP-a čak i cijelo desetljeće nakon traumatskog događaja. Njihova subjektivna kvaliteta života razmjerno je niska, a imaju i znatne troškove skrbi. Čimbenici za koje je pokazano da utječu na pojavu PTSP-a također se čine važnima za oporavak od PTSP-a. Trenutni PTSP može smanjiti subjektivnu kvalitetu života neovisno o društvenim čimbenicima.