

Funkcionalna neovisnost, dijagnostičke skupine, boravak u bolnici i modalitet plaćanja u tri hrvatska obalna centra za rehabilitaciju

Nada Tomasović Mrčela, Dražen Massari, Tonko Vlak

Cilj Odrediti funkcionalnu neovisnost pacijenata, dijagnostičke skupine, trajanje boravka u bolnici i modalitet plaćanja rehabilitacije u glavnim specijaliziranim bolnicama za reumatologiju i medicinsku rehabilitaciju na hrvatskoj obali.

Postupci U presječnom istraživanju provedenom od listopada 2006. do siječnja 2009. ispitali smo 400 bolesnika liječenih u 3 specijalizirane bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Odredili smo njihovu funkcionalnu neovisnost modificiranim Barthelovim indeksom a oni su sami ocijenili svoje zdravlje uz pomoć prve čestice Kratkog upitnika o zdravlju od 36 čestica.

Rezultati Po dolasku u bolnicu gotovo pola bolesnika (46%) bilo je potpuno neovisno, 33% je bilo u maloj mjeri ovisno, dok je 21% bilo umjereno ili jako ovisno. Na izlasku iz bolnice, značajni prediktori povišenja Barthelovog indeksa bili su dulji boravak u bolnici (omjer izgleda [engl., OR], 1,14; 95% raspon pouzdanosti [engl., CI], 1,06-1,22), dijagnoza post-proceduralnih muskuloskeletalnih poremećaja (OR, 4,84; 95% CI, 1,90-10,57), dijagnoza stanja nakon akutne ishemične bolesti srca (OR, 9,71; 95% CI, 3,40-27,75), i niži Barthelov indeks pri primitku u bolnicu (OR, 0,96; 95% CI, 0,94-0,97). Od 97 bolesnika s dorzopatijom, 73 (75%) je bilo potpuno funkcionalno neovisno a 57 (59%) je samo platilo za ukupno liječenje ili su znatno doprinijeli plaćanju.

Zaključak Procjena funkcionalnog statusa bolesnika važna je za organizaciju rehabilitacije. Bolesnici s dorzopatijom identificirani su kao skupina bolesnika koja bi mogla posjećivati rehabilitacijske bolnice kao medicinski turisti i tako povećati njihovo korištenje.