

Prevalencija nasilja u obitelji među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Sloveniji u petogodišnjem razdoblju (2005.-2009.)

Nena Kopčavar Guček, Igor Švab, Polona Selič

Cilj Utvrditi prevalenciju izloženosti obiteljskom nasilju među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Sloveniji i čimbenike povezane s izloženošću.

Postupci U ovom sistematskom presječnom istraživanju, 70 liječnika iz 70 ordinacija obiteljske medicine iz gradskih i seoskih sredina intervjuirali su svakog petog pacijenta od 15. siječnja do 15. veljače, 2010.

Rezultati Od 2075 pacijenata (stopa odaziva 98,8%), 372 (17,9%) bilo je izloženo psihološkom ili fizičkom obiteljskom nasilju u posljednjih 5 godina. Čimbenici koji su povećali izgleda izloženosti psihološkom i fizičkom nasilju bili su ženski spol (omjer izgleda [engl., OR], 3.27; 95% raspon pouzdanosti [engl., CI], 2,24-4,76; $P<0,001$; odnosno OR, 4,52; 95% CI, 2,83-7,20; $P<0,001$) i formalni razvod (OR, 2,08; 95% CI, 1,35-3,21; $P=0,001$; OR, 2,72; odnosno 95% CI, 1,73-4,29; $P<0,001$). Čimbenici koji su povećali izgleda izloženosti psihološkom nasilju bili su dob od 65 godina ili više (OR, 0,56; 95% CI, 0,33-0,96, $P=0,035$) i samački status (OR, 0,43; 95% CI 0,21-0,86, $P=0,016$), dok su dob od 65 godina ili više (OR, 0,43; 95% CI, 0,23-0,79, $P=0,007$) i roditeljstvo dvoje djece (OR, 0,51; 95% CI, 0,29-0,90, $P=0,020$) smanjivali izgleda izloženosti fizičkom nasilju.

Zaključak Stopa izloženosti psihološkom i fizičkom nasilju u našem istraživanju bila je 17,9%, što ukazuje da je to ozbiljan javnozdravstveni problem kojeg treba rješavati odgovarajućim mjerama. Utvrđeni rizični i protektivni čimbenici mogu služiti kao pokazatelj liječnicima obiteljske medicine koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja.